
	AMELİYATHANE DIŐINDA YAPILAN SEDASYON UYGULAMALARINA YÖNELİK KURALLAR			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
HB.TL.04	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 2

- 1. AMAÇ:** Özel Ordu Sevgi Hastanesi'nde ameliyathane dışında sedasyon-analjezi uygulamasının tıbbi kurallara uygun olarak yapılması için yöntem belirlemektir.
 - 2. KAPSAM:** Acil, Doğumhane, endoskopi ve analjezi/sedasyon uygulayan tüm bölümleri ile hekim ve hemşireleri kapsar.
 - 3. KISALTMALAR:**
 - 4. TANIMLAR:**
Sedasyon: Hastanın korku hissini gidermek, ağrı eşiğini yükseltmek, istenmeyen refleksleri önlemek, psişik stresi minimuma indirmek ve kolay bir müdahale ortamı sağlamak için yapılan tıbbi girişimlerdir.
 - 5. SORUMLULAR:** Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları, Anestezi teknikerleri/Teknisyenler
 - 6.FAALİYET AKIŐI:**
 - 6.1.** İşlem gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamda, Anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninden oluşan ekip tarafından intravenöz yol aracılığıyla minimal biliçli veya orta derece biliçli olacak şekilde sedasyon planlanarak uygulanır.
 - 6.2. Sedasyon Uygulanmadan Önce:** Anestezi polikliniğinden, anestezi uzmanı tarafından cerrahi rutin tahlilleri ile değerlendirilerek mevcut genel durumu, ASA risk düzeyi, hava yolu değerlendirilmesi, açlık önerileri, preop mevcut tedavilerinin değerlendirilmesi ve gerekli konsültasyonlar tamamlandıktan sonra hastaya işlem için hastaya randevu verilir.
 - 6.2.** Uygulanmadan önce, hasta işlem hakkında hekim tarafından bilgilendirilir, ve onam formuna onayı alınır.
 - 6.3.** Uygulanmadan önce, hastanın öyküsü, fiziksel muayene ve laboratuvar bulguları değerlendirilir ve ameliyathane dışı anestezi hasta takip formuna ilgili hekim tarafından kaydedilir ve hastanın dosyasında muhafaza edilir. AH.FR.06 AMELİYATHANE DIŐI ANESTEZİ TAKİP FORMU
 - 6.4.** İşlem öncesinde hasta ameliyat öncesi açlık süresine uygun olarak aç kalır.
 - Bu süreler;**
 - Katı gıdalar ve süt için en az 6 saat,
 - Berrak sıvılar için (su ve diğer berrak içecekler) 2 saat,
 - Anne sütü için 4 saattir.
 - 6.5.** Hastaların kan basınçları, EKG'leri, solunum sayısı ve niteliği, puls oksimetre ile periferik oksijen satürasyonu bir monitör ile sedasyon işlemi boyunca izlenir, vital bulguları her beş dakikada bir değerlendirilir ve ilgili hekim tarafından kaydedilir.
 - 6.6.** Bir sonraki ilaç dozu yapılmadan önce bir önceki dozun etkisinin başlaması beklenir.
 - 6.7.** Biliç durumu izlemi için hastanın sözlü emirlere yanıtı kullanılır.
 - 6.8.** Hasta kendi başına havayolu sürekliliğini sağlayabiliyorsa, kardiyovasküler bulguları işlem öncesi değerlerde izleniyorsa, koruyucu refleksleri aktifse ve hasta kolaylıkla uyandırılabilir ise derlenmeye alınır.
 - 6.9.** Monitörizasyon süresi sedasyon düzeyine, hastanın durumuna ve yapılan işleme göre ilgili hekim tarafından belirlenir. Hastanın biliç durumu ve vital bulguları düzenli aralarla ilgili hekimin kontrolünde servis hemşiresi / anestezi teknisyeni tarafından ameliyathane dışı anestezi hasta takip formuna kaydedilir.
 - 6.10.** Her hasta ameliyathane dışı anestezi hasta takip formunda belirtilen hasta çıkış ölçütleri sağlanana dek izlenir.
 - 6.11.** Hastalar ilgili hekimin kararıyla servise transfer veya taburcu edilir.
 - 6.12.** Günübirlilik hastalara işlem sonrası diyet, ilaç uygulaması, izin verilen fiziksel aktiviteler, acil durumda ulaşılabilecek telefon numarasını içeren açıklamalar ilgili hekim tarafından yazılı olarak verilir.
- EKLER**

**AMELİYATHANE DIŞINDA YAPILAN
SEDASYON UYGULAMALARINA
YÖNELİK KURALLAR**



DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
HB.TL.04	01.01.2019	0	-	Sayfa 2 / 2

AH.FR.06 AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ TAKİP FORMU

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM